

**Секция «Математика и механика»**

**Классификация почти лагранжевых расслоений**

**Козлов Иван Константинович**

*Студент*

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,*

*Механико-математический факультет, Москва, Россия*

*E-mail: dfkozlov@gmail.com*

Локально-тривиальное расслоение  $\pi : (M^{2n}, \omega) \rightarrow B^n$  называется почти лагранжевым расслоением, если на тотальном пространстве  $M^{2n}$  задана невырожденная 2-форма  $\omega$  т.ч.  $d\omega = \pi^*\psi$  для некоторой 3-формы  $\psi$  на базе  $B^n$  и ограничение формы  $\omega$  на каждый слой тождественно равно нулю  $\omega|_{F^n} \equiv 0$ .

В докладе будет описан полный список инвариантов, классифицирующих почти лагранжевые расслоения с точностью до послойного симплектоморфизма, тождественного на базе (т.е. с точностью до лагранжевой эквивалентности). Оказалось, что почти лагранжевые расслоения полностью определяются решеткой, первым препятствием к построению сечения и классом двумерных когомологий базы. Точнее, два почти лагранжева расслоения  $\pi : (M^{2n}, \omega + \pi^*\varphi_i) \rightarrow B^n$  ( $i = 1, 2$ ) с решеткой  $P \subset TB^n$  лагранжево эквивалентны тогда и только тогда, когда  $\varphi_2 - \varphi_1 = d\alpha$  для некоторого сечения  $\alpha : B^n \rightarrow T^*B/P$ .

Также в докладе будут кратко изложены результаты работы [1].

**Литература**

1. Козлов И. К. Классификация лагранжевых расслоений // Математический сборник. 2010. Т. 201. №. 11. С. 89–136.